香港西貢黃地峒遺址

2005　　第一次正式發掘簡報

香港考古學會

一 前言

黃地峒遺址位於香港特區東部的赤門海峽企　下海的東海岸，香港西貢西郊野公園榕樹澳至深涌中段，地　位置　　114°17′E，22°26′N。其具體範圍：東　黃地峒山西麓 50m至 60m等高線處，西至海邊潮間帶以下淺海，南起鰲魚頭，　至深涌碼頭南約 600m處。

2004 年度香港考古學會得香港特區政府康樂及文化事務署轄下的古物古蹟辦事處撥款 15.7 萬港元，與中山大學嶺南考古研究中心合作在黃地峒遺址一帶進行了調查試掘。2005 年度再得古物古蹟辦事處撥款 15 萬港元，在 2005 年 12 06 年 1 月在此遺址進行第一次正式發掘。　與發掘有國家文物局專家組成員、中國科學院古脊椎與古人　研究所張森水先生、中山大學　南考古研究中心主任張鎮洪教授，王宏副教授、譚惠忠研究員、中山大學地球科學系主任鄭卓博士、澳門藝術博物館員陳炳輝、趙月紅、考古學會會員彭少瓊、陳盈康和胡鈺真。香港考古學會會委員蕭美　小姐、陳錦榮先生負責財務、　政，委員王惠標先生負責全部石器攝影，吳偉鴻任　隊並負責石器繪圖。

此外，中國科學院古脊椎與古人　研究所吳新智院士、高星副所長、廣東文物考古研究所所長、中國社會科學院傅憲國先生、陳星燦博士、香港中文大學鄧聰博士、香港古物古蹟辦事處總館長吳志華博士、孫德榮館長、博士和曾志雄等先生，香港考古學家王文建先生和　茂　士支持工作並到場給予寶貴意　。

二 發掘方法

使用舊石器田野考古的布方和發掘方法，包括人工層位(以每 5cm或 10cm為一層)和單位發掘法；繪製各人工層 1/10 平面圖；測　各人工層位和重要石製品的高程；記　各人工層的土壤特性和顏色。　　非石製品的角礫的大小。此外，在黃地峒西麓進　地表勘察和採集。

在 2004　　探方之東布方 15 個，即T6 至T20。每個探方為 1mx1m，因經費拮据，只發掘第二號採石場QT1 和清　採石場南壁剖面，和發掘　T6、T7、T8、T14、T17 和T20，僅QT1、採石場南壁和T14 方掘至風化基岩，其餘者皆在文化層上覆塑　布，再覆　土暫時封存。

三 遺址地貌、地質和古環境

黃地峒遺址位於西貢半島西側，其區域地貌　型屬半島海灣型。黃地峒　一座小丘，海拔高　154m。東面與石屋山相　，西麓面向企　下海，西側山坡的坡　　23°　38°，局部有 10°左右的緩坡。

黃地峒遺址的基岩　粗　火山灰凝灰岩，其上層　薄層　凝灰岩及凝灰岩，夾層為砂岩、粉砂岩和　岩。遺址的岩層基本呈NW—SE走向，傾向 35°　110°，傾角 15°　57°。局部有折曲構造。

據《香港第四紀地質》、《珠江三角洲形成發育演變》[1]等研究成果綜合，約 120,000　前的間冰期，香港氣候比現在和暖。海平面高於現海平面約 4m　6m，即現在整個企　下海地區均在水下之中，出　地表只限於山坡上採石場殘坡積；其後氣候逐漸寒　，大約在 75,000　前，　冰期最寒　期，海平面比現在低約 77m，整個企　下海因此出　於海平面之上。其後，氣候漸暖，海平面亦相繼上升。氣候在 28,000　前最　暖和，香港乃至珠江三角洲的低窪地被海水覆蓋。大約從距今 25,000　開始，氣候再次變　，距今 18,000　17,000　前最　寒　，海平面下　至現今海平面以下 120　130m，即最後冰期。距今 12,000　11,000　，氣候開始變暖，海平面上升，大約在 7,000　6,000　前，海平面曾高於現在 1　3m，之後緩慢下　到現今水平。

本地區的地殼運動也是在　斷變化的，自第三紀以　，基本　抬升，上升速　　2.5　8.0mm/a。因此，在分析遺址的　代和古環境時，須將海平面變化和地殼上升　個因素同時考慮在內。

根據前述海平面變化和地殼運動的時間表，在距今 75,000　前後的冰期，隨著地殼　升和海退，香港地區大部分的半島和　島　　一體，大埔吐　港至大鵬灣的赤門海峽只是一條河　，而企　下海是其中一條較大的支　(圖 1)，局部河段存在河谷平地及河　階地，有著適合人　生活和居住的　想環境。隨　後，海平面上升，原先人　生活的場所逐漸被水淹沒，成　「水下平台」。最

[1] Fyfe, J. A and others 2000 *The Quaternary Geology of Hong Kong*, Hong Kong SAR Government, 黃鎮國、　平日等，1982，《珠江三角洲形成發育演變》，廣州，科普出版社廣州分社。

後冰期始於距今 25,000　，距今 18,000 左右達到最盛期，海平面僅　現今海平面的-120　-130m。這時，「水下平台」又出　水面，再次　古人　提供一個生活場所。最後冰期過後，海平面迅速上升，期間有過　次高於現今海平面。大約距今 6,000　海平面基本在現今水平上下波動，也就是　6,000　前至今，人　是　可能在企　下海的水下平台上活動的。

根據 2004　　孢粉分析結果表明，黃地峒遺址區自第三紀以　，地表植物的組合沒有多大的變化，主要　熱帶、亞熱帶植物以及少　溫帶植物的科屬，所反映的氣候主要　熱帶－亞熱帶型。植被以常　或闊　混交　　主，夾有針　，　下蕨　植物生長繁盛。第四紀　新世晚期香港地區的孢粉分析表明，當時香港地區植物為熱帶－亞熱帶喬木，並有熱帶蕨　。此外，也有一些溫帶－亞熱帶的　　樹種。



圖 1 香港晚　新世河道　原圖

(引自《香港第四紀地質》(*The Quaternary Geology of Hong Kong*) 2000　版)